

安形医院 外来看護

感染予防対策

標準予防策 マスク着用、1 行動 + 1 手洗い(やむを得ない場合はアルコール消毒で代用)を講じる。

午前の外来終了後に次亜塩素酸水での拭き取り掃除、午後の外来終了後に次亜塩素酸ナトリウム(ミルトン)を使用した拭き取り掃除を行う。キッチンペーパーで手の触れる部分(待合椅子、外来手すり、ドアノブ、レントゲン室、職員が触る取手、診察台、処置台など)を午前および午後の外来終了後に拭き取り掃除を行う。午前は次亜塩素酸水を、午後は次亜塩素酸ナトリウム(ミルトン)を使用する。

床掃除は午後の外来終了後に次亜塩素酸ナトリウム(ミルトン)でモップを用いて行う。

※ミルトン使用後は水拭きを行う。

※次亜塩素酸は繰り返し使えるキッチンペーパー(青)を、水拭きには(白)を1日1枚使用する。

発熱や咳などの有症状のレントゲン撮影時は介助時のグローブ着用、撮影台のミルトン(次亜塩素酸ナトリウム)噴霧 + 水拭き(使い捨てキッチンペーパー使用)。

<内視鏡検査>

- ① プラスチックグローブを1件ごとに交換(直接介助、記録係ともに)。
- ② ガウンは1日1枚の交換(直接介助、記録係ともに)。
- ③ フェイスシールドは使用後に次亜塩素酸水で消毒、汚染が目立つようなら交換する。
- ④ 毎回手洗いを行う。